

インフルエンザ予防接種を受けられる方へ — H29 年度 —

月	日 ()	受付時間	午後 3 時 2 0 分 ~ 午後 4 時 0 0 分
		接種開始	午後 3 時 4 5 分 ~
		受付及び接種場所	佐渡病院 2 階 講堂
		予約変更連絡先	健診センター (63-6324)

▶ 当日持参していただく物

- ・ 問診票
- ・ 接種費用補助金交付申請書兼受領委任払承認申請書
- ・ 母子手帳

- ※ 当日は、体温測定を行い、問診票の不備がないかをチェックし、番号をお取りします。番号順に医師の診察を行い、接種となります。着脱しやすい服装でお出かけ下さい。
- ※ 接種予定日の 1 週間前に熱が出た場合は、接種できません。また、当日体調が悪い、都合で来られなくなった場合は、できるだけ午前中に連絡下さい。
- ※ 当院の口座振替を登録していて、接種料金を口座から引き落としたい方は、会計する際に申し出てください。

● インフルエンザ予防接種の副反応について

局所の発赤、腫れ、痛みなどがみられることがあります。また、まれに全身反応として発熱、悪寒、頭痛、倦怠感などがありますが、通常 2～3 日で消失します。高熱が出る、だるいなどの困る症状があれば、病院受診をお願いします。

非常にまれですが、ショック症状、急性散在性脳脊髄炎（発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など）、けいれん、ギランバレー症候群（手足のしびれ、歩行障害など）、肝機能障害、ぜんそく発作などの重篤な副反応が認められることがあります。

● インフルエンザ予防接種を受ける際、注意を要する者

1. 明らかな発熱（37.5 度以上）を呈している場合
2. 重篤な急性疾患にかかっている場合
3. 以前にインフルエンザの予防接種で、異常な副反応を呈したことがある場合
4. 卵・鶏肉・その他鶏に由来のある物に対してアレルギーを呈する恐れのある場合
5. 接種前 1 年以内に全身けいれんを起こしたことがある場合

● 予防接種後の注意

1. 接種後 30 分は副反応が出やすい時間です。病院内にいますようにして、様子観察をお願いします。身体に変調をきたした場合は、医師の診察を受けましょう。
2. 接種後 24 時間は副反応の出現に注意しましょう。
3. 接種当日の入浴は差し支えありません。注射部位をこすらないようにしましょう。
4. 接種当日の激しい運動はやめましょう。

インフルエンザ予防接種を受けられる方へ — H29 年度 —

月	日 ()	受付時間	午後 3 時 20 分 ~ 午後 4 時 00 分
		接種開始	午後 3 時 45 分 ~
		受付及び接種場所	<u>2 階 人間ドック室 (エスカレーター上がった所に受付)</u>
		予約変更連絡先	健診センター (63-6324)

▶ 当日持参していただく物

- ・ 問診票
- ・ 接種費用補助金交付申請書兼受領委任払承認申請書
- ・ 母子手帳

※ 当日は、体温測定を行い、問診票の不備がないかをチェックし、番号をお取りします。番号順に医師の診察を行い、接種となります。着脱しやすい服装でお出かけ下さい。

※ 接種予定日の 1 週間前に熱が出た場合は、接種できません。また、当日体調が悪い、都合で来られなくなった場合は、できるだけ午前中に連絡下さい。

※ 当院の口座振替を登録していて、接種料金を口座から引き落としたい方は、会計する際に申し出てください。

● インフルエンザ予防接種の副反応について

局所の発赤、腫れ、痛みなどがみられることがあります。また、まれに全身反応として発熱、悪寒、頭痛、倦怠感などがありますが、通常 2～3 日で消失します。高熱が出る、だるいなどの困る症状があれば、病院受診をお願いします。

非常にまれですが、ショック症状、急性散在性脳脊髄炎（発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など）、けいれん、ギランバレー症候群（手足のしびれ、歩行障害など）、肝機能障害、ぜんそく発作などの重篤な副反応が認められることがあります。

● インフルエンザ予防接種を受ける際、注意を要する者

1. 明らかな発熱 (37.5 度以上) を呈している場合
2. 重篤な急性疾患にかかっている場合
3. 以前にインフルエンザの予防接種で、異常な副反応を呈したことがある場合
4. 卵・鶏肉・その他鶏に由来のある物に対してアレルギーを呈する恐れのある場合
5. 接種前 1 年以内に全身けいれんを起こしたことがある場合

● 予防接種後の注意

1. 接種後 30 分は副反応が出やすい時間です。病院内にいて様子観察をお願いします。身体に変調をきたした場合は、医師の診察を受けましょう。
2. 接種後 24 時間は副反応の出現に注意しましょう。
3. 接種当日の入浴は差し支えありません。注射部位をこすらないようにしましょう。
4. 接種当日の激しい運動はやめましょう。