

インフルエンザ予防接種を受けられる方へ 一令和6年度一

月	日 ()	受付時間	午後3時00分～午後4時00分
		接種開始	午後3時30分～
		受付及び接種場所	佐渡総合病院2階 講堂
		予約変更連絡先	健診センター（63-6324）

►当日持参していただく物

- 予診票（必要事項を記入してお持ちください。) 診察券
- 接種券（65才以上の方と、60～64才の方で、心臓疾患・腎臓疾患・呼吸器疾患で、身体障害者1級に該当する方で、佐渡市に申請した方のみ)

- ※ 肘の上まで、まくり上げられる服装でおいでください。
- ※ 当院の口座振替・クレジットカード等からの支払いも可能です。
- ※ 生活保護世帯は、佐渡市に申請すると接種券が発行され無料となります。
必ず接種前に佐渡市役所へ申請してください。

●インフルエンザ予防接種の副反応について

局所の発赤、腫れ、痛みなどがみられることがあります。また、まれに発熱、悪寒、頭痛、倦怠感などがありますが、通常2～3日で消失します。高熱が出る、だるいなどの困る症状があれば、病院受診をお願いします。

重大な副反応として、まれにショック（冷汗、めまい、顔面蒼白、手足が冷たくなる、意識消失）、アナフィラキシー（全身のかゆみ、蕁麻疹、のどのかゆみ、呼吸困難）などが現れることがあります、そのほとんどは30分以内に生じます。その他、急性散在性脳脊髄炎（発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など）、けいれん、ギランバレー症候群（両手足のしびれ、歩行障害など）、肝機能障害、ぜんそく発作などの重篤な副反応が認められます。

●インフルエンザ予防接種を受ける際、注意を要する者

1. 明らかな発熱（37.5度以上）を呈している場合
2. 風邪のひきはじめだと思われる場合
3. 重篤な急性疾患にかかっている場合
4. インフルエンザの予防接種で、異常な副反応を呈したことがある場合
5. 卵・鶏肉・その他鶏に由来のある物に対してアレルギーを呈する恐れのある場合

●予防接種後の注意

1. 接種後30分は副反応が出やすい時間です。病院内にいるなどして、様子観察をお願いします。局所の異常な反応や体調の変化、さらに、高熱やけいれん等の異常な症状を呈した場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
2. 接種後24時間は副反応の出現に注意しましょう。
3. 接種当日の入浴は差し支えありません。注射部位をこすらないようにしましょう。
4. 接種当日の激しい運動や大量の飲酒はやめましょう。